

При смене терапии с ингибиторов PCSK9 на инклисиран у некоторых пациентов наблюдается временное повышение уровня ХС ЛНП. Чем обусловлен этот эффект, влияет ли на долгосрочные результаты лечения, и стоит ли его опасаться?

Image



При смене терапии с ингибиторов PCSK9 на инклисиран у некоторых пациентов наблюдается временное повышение уровня ХС ЛНП. Чем обусловлен этот эффект, влияет ли на долгосрочные результаты лечения, и стоит ли его опасаться?

Ответ на этот вопрос — в новом видео: «Как меняется уровень ХС ЛНП при переключении с ингибиторов PCSK9 на инклисиран и почему это не должно вызывать беспокойства?». Расскажет доктор медицинских наук, профессор Напалков Дмитрий Александрович.

Теги

- Кардиология

Source URL:

<https://pro.novartis.ru/therapeutical-areas/cardiology/Inclisiran-FAQ/pri-smene-terapii-s-ingi-bitorov-pcsk9-na-inklisan-u-nekotoryh-pacientov-nablyudaetsya-vremennoe-povyshenie-urovnnya-hs-lnp-chem-obusloven-etot-effekt-vliyaet-li-na-dolgosrochnye-rezultaty-lecheniya>