

Ювенильный псориатический артрит

Image



Ювенильный псориатический артрит

Ювенильный идиопатический артрит (ЮИА) — мультифакторное заболевание, патогенетические особенности развития которого отличаются при разных вариантах болезни. ЮИА — гетерогенная группа артритов.




Согласно классификации ILAR различают 7 вариантов ЮИА в зависимости от характера дебюта заболевания, наличия ревматоидного фактора, обнаружения у родственников псориаза, а также выявления энтезита:

- Системный ювенильный идиопатический артрит
- Олигоартикулярный ювенильный идиопатический артрит
- Полиартикулярный ювенильный идиопатический артрит, РФ-негативный
- Полиартикулярный ювенильный идиопатический артрит, РФ-позитивный
- **Ювенильный псориатический артрит**
- Артрит, ассоциированный с энтезитом
- Недифференцированный артрит (артрит, не отвечающий критериям какой-либо категории или отвечающий критериям более чем двух из представленных категорий)





Согласно международной классификации ILAR, юПсА - это артрит в сочетании с псориазом или артрит в сочетании с 2-мя из критериев включения при соблюдении критериев исключения

Image

Критерии включения:

-  дактилит (осевое поражение суставов одного пальца)
-  поражение ногтей по типу синдрома «наперстка» или онихолизис
-  псориаз у родственников 1-й степени родства

Критерии исключения:

-  артрит HLA-B27 позитивный у мужского пола старше 6 лет, анкилозирующий спондилит, энтезит-ассоциированный артрит, сакроилеит в сочетании с ВЗК, реактивный артрит, в том числе синдром Рейтера, острый передний увеит или наличие одного из перечисленных состояний у родственников 1-й степени родства;
-  позитивность по ревматоидному фактору (РФ)
-  наличие системного варианта ЮИА
-  артрит отвечающий критериям двух и более вариантов ЮИА

Согласно данным регистра CARRA наиболее частые клинические проявления юПСА

Image

Мальчики (%)	35,3%	
Возраст манифестации/постановки диагноза, лет	8.29 ± 4.65	
Семейный анамнез псориаза	32,3%	←
Псориаз	68,5%	
HLA B-27	10%	
Активное воспаление илиосакральных сочленений	28,6%	
Энтезиты (%)	30,1%	←
Увеиты (%)	11,4%	
Изменение ногтя	34,1%	←
Дактилиты (%)	29,4%	

Список сокращений

- **ЮИА** — ювенильный идиопатический артрит.
- **юПсА** — Ювенильный псориазический артрит.
- **РФ** — ревматоидный фактор;
- **ВЗК** — воспалительные заболевания кишечника;
- **ILAR** — Международная лига по борьбе с ревматизмом (от англ. International League Against Rheumatism);
- **CARRA** - Союз ревматологических исследований детского артрита (от англ. The Childhood Arthritis and Rheumatology Research Alliance)

Список литературы

1. Алексеева Е. И. Вопросы современной педиатрии 2015;14:78–94.
2. Aaida Samad, Matthew L. Stoll, Idit Lavi, Joyce J. Hsu, Vibeke Strand, Thomas N.

Robinson, Elizabeth D. Mellins and Devy Zisman for the CARRA Legacy Registry Investigators The Journal of Rheumatology March 2018, 45 (3) 411-418; DOI: <https://doi.org/10.3899/jrheum.170598>

11561506/SEC/web/12.25

Читать про Энтезит-ассоциированный артрит

Image



Один из подтипов ювенильного идиопатического артрита (ЮИА), характеризующийся поражением не только суставов, но и энтезисов, а также осевого скелета (сакроилиит, спондилит).

[Подробнее](#)

Теги

- Ревматология
-

Source URL:

<https://pro.novartis.ru/therapeutical-areas/rheumatology/yuvenilnyy-idiopaticheskiy-artrit/poleznye-materialy/yuvenilnyy-psoriaticheskiy-artrit>