



Клинический разбор №5

В рамках «Полиморбидной Академии» мы опубликовали несколько клинических ситуаций, требующих особенно внимательного подхода к диагностике и терапии. Цикл разборов завершает случай*, подготовленный при участии Ектерины Васильевны Глейкиной, заведующей кардиологическим отделением №2 ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая больница».

В фокусе внимания пациент с ХСН IIA и поражением почек, госпитализированный в связи с признаками острой сердечной недостаточности. В анамнезе:

- Инфекционный эндокардит с поражением митрального клапана, митральная недостаточность 2 ст.;
- Повышение АД до 190/100 мм рт.ст. с исключительно симптоматической терапией в течение нескольких лет;
- Стенокардия на II ФК в течение нескольких лет;
- По шкале CHA₂DS₂-VASc — 9 баллов.

Пациенту назначено лечение, однако менее чем через год потребовалась повторная госпитализация в связи с ОДСН. Какие коррективы необходимы, чтобы стабилизировать ситуацию? Давайте разберемся вместе.

* — гипотетический клинический случай

11275290/SAC-VAL_INC/DIG/04.26/0

Теги

- Кардиология

Source URL: <https://pro.novartis.ru/therapeutic-areas/cardiology/hsn/clinical-case-5>