

Элтромбопаг в лечении ИТП у детей

Image




## Элтромбопаг в лечении ИТП у детей

Эффективность элтромбопага доказана в исследованиях на пациентах с ИТП детского возраста

Image

**62% пациентов ответили на терапию  
в исследовании PETIT<sup>1</sup>**




**Частота ответа на 1 неделе лечения составила:**

24,4% в группе элтромбопага, 13,6% в группе плацебо.

Ответ определялся при уровне тромбоцитов  $\geq 50 \times 10^9/\text{л}$  как минимум однократно в промежутке между 1 и 6 неделями рандомизированного двойного слепого исследования.

**40% пациентов ответили на терапию  
в исследовании PETIT2<sup>2</sup>**



**Частота ответа на 1 неделе лечения составила:**

15,9% в группе элтромбопага, < 1% в группе плацебо.

Ответ определялся при уровне тромбоцитов  $\geq 50 \times 10^9/\text{л}$  в течение  $\geq 6$  из 8 недель в промежутке между 5 и 12 неделями рандомизированного двойного слепого исследования.


**Револейд уменьшает кровотечения и снижает необходимость использования неотложной терапии**

Image

По данным исследования PETIT2, в группе элтромбопаг наблюдалось достоверное уменьшение кровотечений, в том числе клинически значимых кровотечений



Неотложная терапия требовалась меньшему числу пациентов, получавших элтромбопаг, по сравнению с получавшими плацебо



Элтромбопаг обладает приемлемым уровнем безопасности у детей

- НЯ становились причиной прекращения лечения лишь в 5% случаев в исследованиях PETIT и PETIT2.
- В обоих исследованиях большинство НЯ были 1 и 2 степени.

Доля пациентов с НЯ 3 и 4 степени

Image

| PETIT (n = 44)  |                 |
|-----------------|-----------------|
| Степень 3 n (%) | Степень 4 n (%) |
| 3 (6,8%)        | 2 (4,5%)        |

| PETIT2 (n = 63) |                 |
|-----------------|-----------------|
| Степень 3 n (%) | Степень 4 n (%) |
| 8 (12,7%)       | 0               |

НЯ, встречающиеся у ≥ 3% пациентов в исследованиях PETIT и PETIT2 (объединенные данные)

Image

| НЯ                                 | Элтромбопаг (n = 107) | Плацебо (n = 50) |
|------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Инфекции верхних дыхательных путей | 17%                   | 6%               |
| Назофарингит                       | 12%                   | 4%               |
| Кашель                             | 9%                    | 0%               |
| Лихорадка                          | 9%                    | 8%               |
| Диарея                             | 9%                    | 2%               |
| Ринит                              | 9%                    | 6%               |
| Боль в животе                      | 8%                    | 4%               |
| Орофарингеальная боль              | 8%                    | 2%               |
| Зубная боль                        | 6%                    | 0%               |
| Повышение АЛТ                      | 6%                    | 0%               |
| Сыпь                               | 5%                    | 2%               |
| Повышение АСТ                      | 4%                    | 0%               |
| Насморк                            | 4%                    | 0%               |

## Список литературы

1. Bussel J.B., de Miguel P.G., Despotovic J.D. et al. Eltrombopag for the treatment of children with persistent and chronic immune thrombocytopenia (PETIT): a randomised, multicentre, placebo-controlled study. *Lancet Haematol.* 2015;2(8):e315-e325.
2. Grainger J.D., Locatelli F., Chotsampancharoen T. et al. Eltrombopag for children with chronic immune thrombocyto- penia (PETIT2): a randomised, multicentre, placebo-controlled trial. *Lancet.* 2015;386(10004):1649-1658.

11213659/REV/WEB/07.24/0

---

## Теги

- Гематология

---

**Source URL:**

<https://pro.novartis.ru/therapeutical-areas/hematology/eltrombopag-v-lechenii-ity-u-detey>