


Противоопухолевый эффект и качество жизни: есть ли необходимость жертвовать?
Наблюдение экспертов МКНЦ им. А.С. Логинова
Image



Противоопухолевый эффект и качество жизни: есть ли необходимость жертвовать? Наблюдение экспертов МКНЦ им. А.С. Логинова

Метастатический люминальный В HER2-негативный рак молочной железы (HR+/HER2- мРМЖ) является одним из наиболее распространенных подтипов РМЖ, занимая одно из ведущих мест в мировой структуре заболеваемости и смертности среди женщин. Текущим «золотым стандартом» лечения 1-й линии определена комбинация ингибиторов CDK4/6 с ингибиторами ароматазы, среди которых выделяют рибоциклиб с летрозолом — единственную на сегодняшний день комбинацию, подтвердившую увеличение общей выживаемости при использовании в 1-й линии.

По данным исследования MONALEESA-2, добавление рибоциклиба к летрозолу достоверно увеличило медиану общей выживаемости до 63,9 мес., снижая относительный риск смерти на 24%. Комбинация имеет благоприятный профиль безопасности, токсичность предсказуема и управляема. Развитие нежелательных явлений привело к прерыванию терапии только в 7,5% случаев. Безопасность и эффективность комбинации подтверждена и в исследовании реальной клинической практики CompLEEment-1.

Сохранение и улучшение качества жизни является одной из главенствующих задач в лечении пациенток с HR+/HER2- мРМЖ. По данным исследования MONALEESA-2, добавление рибоциклиба значительно влияет на длительность сохранения качества жизни и приводит к уменьшению интенсивности болевого синдрома.

Опубликованные данные позволили присвоить комбинации рибоциклиба и летрозола 4 балла по шкале ESMO-MCBS. Безопасность длительного применения комбинации в 1-й линии лечения иллюстрирована множеством собственных клинических наблюдений, одно из которых приведено в данной публикации. Выживаемость без прогрессирования на фоне терапии у пациентки составила 40 мес., что значительно превышает данные исследований MONALEESA-2 и CompLEEment-1. Максимальный

эффект — частичный ответ по RECIST 1.1 (-40%), достигнут через 24 нед. и сохранялся на протяжении 24 мес. Клинически пациентка отметила уменьшение выраженности болевого синдрома уже через 8 нед. терапии. На фоне терапии удалось поддержать качество жизни, не жертвуя при этом противоопухолевой эффективностью.

К.С. Гречухина, К.А. Воронцова, Д.А. Филоненко, П.С. Тютюнник, В.В. Щадрова, Л.Г. Жукова, ГБУЗ «Московский клинический научно-практический центр им. А.С. Логинова» Департамента здравоохранения г. Москвы, Москва, Россия

Image

Журнал кафедры онкологии и паллиативной медицины им. акад. А.И. Савченко
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования»
Москва, Россия

ISSN 1815-1436 Print
ISSN 1815-1442 Online

CONSILIUM
MEDICUM

Оmnidoctor >

Современная
Онкология

Материал опубликован в №3, 2022 г.

<https://doi.org/10.26442/18151436.2022.3.201895>

КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Противоопухолевый эффект и качество жизни: есть ли необходимость жертвовать? Клиническое наблюдение: длительный и безопасный контроль над болезнью при помощи комбинации рибоциклиба с летрозолом

К.С. Гречухина¹, К.А. Воронцова, Д.А. Филоненко, П.С. Тютюнник, В.В. Щадрова, Л.Г. Жукова
ГБУЗ «Московский клинический научно-практический центр им. А.С. Логинова» Департамента здравоохранения г. Москвы, Москва, Россия

Аннотация
Метастатический инвазивный В-HER2-негативный рак молочной железы (ИВ-HER2-нРМЖ) является одним из наиболее распространенных подтипов РМЖ, занимая одно из ведущих мест в мировой структуре заболеваемости и смертности среди женщин. Текущим «золотым стандартом» лечения 1-й линии определена комбинация ингибиторов CDK4/6 с ингибиторами ароматазы, среди которых выделяет рибоциклиб с летрозолом – единственную на сегодняшний день комбинацию, подтверждающую увеличение общей выживаемости при использовании в 1-й линии. По данным исследования MONALEESA-2, добавление рибоциклиба к летрозолу достоверно увеличило медиану общей выживаемости до 63,3 мес., снижало относительный риск смерти на 24%. Комбинация имеет благоприятный профиль безопасности, токсичность предсказуема и управляема. Развитие нежелательных явлений привело к прерыванию терапии только в 7,5% случаев. Безопасность и эффективность комбинации подтверждена и в исследовании реальной клинической практики ComPLEment-1. Сохранение и улучшение качества жизни является одной из главнейших задач в лечении пациенток с ИВ-HER2-нРМЖ. По данным исследования MONALEESA-2, добавление рибоциклиба значительно влияет на длительность сохранения качества жизни и приводит к уменьшению интенсивности болевого синдрома. Опубликованные данные позволили присвоить комбинации рибоциклиба и летрозола 4 балла по шкале ESMO-MCBS, безопасность длительного применения комбинации в 1-й линии лечения иллюстрирована множеством собственными клиническими наблюдениями, одно из которых приведено в данной публикации. Выживаемость без прогрессирования на фоне терапии у пациентки составила 40 мес., что значительно превышает данные исследований MONALEESA-2 и ComPLEment-1. Максимальный эффект – частичный ответ по RECIST 1.1 (-40%), достигнут через 24 нед. и сохранялся на протяжении 24 мес. Клинически пациентка отметила уменьшение выраженности болевого синдрома уже через 8 нед. терапии. На фоне терапии удалось поддержать качество жизни, не жертвуя при этом противоопухолевой эффективностью.

Ключевые слова: рак молочной железы, инвазивный подтип, качество жизни, рибоциклиб, летрозол
Для цитирования: Гречухина К.С., Воронцова К.А., Филоненко Д.А., Тютюнник П.С., Щадрова В.В., Жукова Л.Г. Противоопухолевый эффект и качество жизни: есть ли необходимость жертвовать? Клиническое наблюдение: длительный и безопасный контроль над болезнью при помощи комбинации рибоциклиба с летрозолом. Современная Онкология. 2022;3(3):373–379. DOI: 10.26442/18151436.2022.3.201895
© ООО «Консилиум Медикум», 2022 г.

Информация об авторах / Information about the authors
Гречухина Катерина Сергеевна – зав. химиотерапевтическим отд.-чем Центра амбулаторной онкологической помощи, преподаватель онкологического консиллиума ГБУЗ «МФОЦ» им. А.С. Логинова. E-mail: dr.grechukhina@gmail.com, ORCID: 0000-0002-0616-5477
Воронцова Карина Андреевна – канд. мед. наук, зав. отд. организации клинических исследований ГБУЗ «МФОЦ» им. А.С. Логинова. ORCID: 0000-0003-2729-8875
Филоненко Дарья Александровна – канд. мед. наук, зав. отделением стандартов по онкологическому профилю ГБУЗ «МФОЦ» им. А.С. Логинова. ORCID: 0000-0002-7224-3131
Тютюнник Павел Станиславович – канд. мед. наук, ст. науч. сотр. отд.-чем химиотерапевтической помощи и хирургической онкологии ГБУЗ «МФОЦ» им. А.С. Логинова. ORCID: 0000-0002-4410-7255
Щадрова Виктория Васильевна – врач-рентгенолог рентгенологического отд.-чем ГБУЗ «МФОЦ» им. А.С. Логинова. ORCID: 0000-0003-3431-0896
Жукова Людмила Григорьевна – чл.-кор. РАН, д-р мед. наук, зам. дир. по онкологии ГБУЗ «МФОЦ» им. А.С. Логинова. ORCID: 0000-0003-4848-4938

Катерина S. Grechukhina – Department Head, Logvinov Moscow Clinical Scientific Center. E-mail: dr.grechukhina@gmail.com, ORCID: 0000-0002-0616-5477
Karina A. Vorontsova – Cand. Sci. (Med.), Logvinov Moscow Clinical Scientific Center. ORCID: 0000-0003-2729-8875
Daria A. Filonenko – Cand. Sci. (Med.), Logvinov Moscow Clinical Scientific Center. ORCID: 0000-0002-7224-3131
Pavel S. Tyutyunik – Cand. Sci. (Med.), Logvinov Moscow Clinical Scientific Center. ORCID: 0000-0002-4410-7255
Victoria V. Shchadrova – radiologist, Logvinov Moscow Clinical Scientific Center. ORCID: 0000-0003-3431-0896
Ludmila G. Zhukova – D. Sc. (Med.), Corr. Memb. RAS, Logvinov Moscow Clinical Scientific Center. ORCID: 0000-0003-4848-4938

СОВРЕМЕННАЯ ОНКОЛОГИЯ. 2022. № 3: 373–379. PUBLISHED

JOURNAL OF MODERN ONCOLOGY. 2022. № 3: 373–379. PUBLISHED

1

Вся информация на сайте размещена с разрешения ООО «Консилиум Медикум». Размещение с нарушением условий лицензионного соглашения является нарушением законодательства.
Все материалы, опубликованные на сайте, являются интеллектуальной собственностью ООО «Консилиум Медикум» и охраняются законом.

[Скачать материал](#)

778504/web/gen/03.24/1

Теги

- Онкология

Source URL:

<https://pro.novartis.ru/ru-ru/therapeutical-areas/oncology/breast-cancer/reviews/protivoopu-holevy-effekt-i-kachestvo-zhizni-est-li-neobhodimost-zhertvovat-nablyudenie-ekspertov-mknc-im-as-loginova>