


Поражение печени при HR+ HER2- рРМЖ: наблюдение экспертов НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина

Image



Поражение печени при HR+ HER2-рРМЖ: наблюдение экспертов НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина

Продолжительность жизни больных метастатическим люминальным HER2-отрицательным РМЖ долгие годы стагнировала на уровне 40 месяцев. Внедрение в практику ингибиторов CDK4/6 изменило стандарты терапии, обеспечив не только значимое увеличение времени без прогрессирования при сохранении высокого качества жизни, но и достоверно повысив общую выживаемость.

Наличие метастазов в печени определяет крайне неблагоприятный прогноз, при ГР+ HER2- мРМЖ сокращая продолжительность жизни до медианы в 21 месяц. Комбинированная с рибоциклибом эндокринотерапия достоверно повысила показатели общей выживаемости в среднем на год, достигнув медиан 36,1 и 46,5 месяца в зависимости от линии лечения.

Данная публикация посвящена метастатическому поражению печени при РМЖ, в частности при люминальном HER2-отрицательном подтипе. Рассмотрены эпидемиологические аспекты, оценены возможности современной системной терапии. Представлен клинический случай успешной терапии рибоциклибом у молодой пациентки с поражением печени.

Е.В. Лубенникова [1], А.С. Царева [1,2], А.А. Кузнецова [1], Е.В. Артамонова [1,2,3]

1. ФГБУ «Российский онкологический научный центр имени Н.Н. Блохина» Минздрава России, Москва
2. ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России, Москва
3. ФУВ ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М.Ф. Владимирского», Москва

Image



[Скачать материал](#)

778504/web/gen/03.24/1

Теги

- Онкология

Source URL:

<https://pro.novartis.ru/ru-ru/therapeutic-areas/oncology/breast-cancer/reviews/porazhenie-pecheni-pri-hr-her2--rrmzh-nablyudenie-ekspertov-nmic-onkologii-im-nn-blohina>