


Стратегии снижения уровня холестерина липопротеинов низкой плотности для профилактики атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний: фокус на применении миРНК, направленных на PCSK9 (инклизирин)

Image



Стратегии снижения уровня холестерина липопротеинов низкой плотности для профилактики атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний: фокус на применении миРНК, направленных на PCSK9 (инклизирин)

Предмет обзора.

Цель терапевтических подходов, основанных на снижении уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС ЛНП), заключается в безопасном и долгосрочном уменьшении воздействия атерогенных липопротеинов на сосудистую стенку, с целью снижения риска атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний (АССЗ) и связанных с ними сердечно-сосудистых осложнений, таких как инфаркт миокарда и ишемический инсульт.

В данном обзоре обобщена концепция, основанная на принципиально новом подходе к эффективному снижению уровня ХС ЛНП – применении синтетической малой интерферирующей рибонуклеиновой кислоты (миРНК) – препарата инклизирин – ингибирующей синтез пропротеиновой конвертазы субтилизин-кексинного типа 9 (PCSK9), а также рассмотрены этапы клинической апробации этого препарата.

Недавно полученные результаты

- За прошедшие годы достигнут существенный прогресс в понимании работы генов, регулирующих обмен атерогенных липопротеинов, и той роли, которую

они играют в развитии атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний. Это открыло возможность разрабатывать методы терапии, заключающиеся в молекулярном воздействии на эти атерогенные липопротеины; в частности, сюда можно отнести терапевтическое воздействие на РНК.

- Наибольший успех достигнут в программе клинических разработок миРНК (инклизирани), воздействующей на синтез PCSK9. В клинических исследованиях этого препарата приняли участие свыше 4000 пациентов.
- В исследованиях I и II фазы установлено, что доза инклизирани 300 мг позволяет добиться эффективного снижения уровня ХС ЛНП. Позже в трёх рандомизированных клинических исследованиях (РКИ) III фазы было продемонстрировано, что режим терапии инклизирани с введениями 1 раз в 6 месяцев позволяет снизить примерно на 50% ХС ЛНП у пациентов с высоким или очень высоким сердечно-сосудистым риском, а также с гетерозиготной семейной гиперхолестеринемией.
- Нежелательные явления в группах инклизирани и плацебо были схожими, за исключением транзиторных реакций в области инъекций, которые встречались чаще на терапии инклизирани, чем в группах плацебо.

Список литературы

1. Sinning D, Landmesser U. Low-density Lipoprotein-Cholesterol Lowering Strategies for Prevention of Atherosclerotic Cardiovascular Disease: Focus on siRNA Treatment Targeting PCSK9 (Inclisiran). Curr Cardiol Rep. 2020 Oct 21;22(12):176. doi: 10.1007/s11886-020-01427-6. PMID: 33089390; PMCID: PMC7578129.

11275290/SAC-VAL_INC/DIG/04.26/0

Теги

- Кардиология

Source URL:

<https://pro.novartis.ru/ru-ru/therapeutical-areas/cardiology/atherosclerosis/strategii-snizheniya-urovnya-holesterina-lipoproteinov-nizkoy-plotnosti-dlya-profilaktiki-ateroskleroticheskikh-serdechno-sosudistyh-zabolevaniy-fokus-na-primenenii-mirnk-napravlennyh-na-pcsk9-inklisiran>